

ENDECTOCIDA PARA BOVINOS E OVINOS

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 34 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

OVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 35 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM OVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

PROIBIDO O USO DESTA PRODUTO EM BOVINOS DE CORTE CRIADOS EM REGIME DE CONFINAMENTOS, SEMI-CONFINAMENTOS E EM REGIME EXTENSIVO NA FASE DE TERMINAÇÃO

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Doramectina1,0 g

Veículoq.s.p.....100,00 mL

Informações técnicas:

A doramectina é uma lactona macrocíclica da família das avermectinas, produto de fermentação do *Streptomyces avermectilis*, derivada por síntese mutacional.

O produto controla com alta eficiência e ampla margem de segurança endo e ectoparasitas simultaneamente.

Indicações:

Bovinos:

DORAX 1 % é indicado no controle das formas adultas e larvas de 4º estágio dos seguintes nematódeos gastrintestinais: *Ostertagia ostertagi* (incluindo larvas hipobioticas), *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata* e *Oesophagostomum radiatum*. Também é indicado no controle das formas adultas de *Haemonchus contortus*, *H. similis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides papillosus* e *Trichuris* spp., bem como no controle de formas adultas e larvas de 4º estágio do nematódeo pulmonar *Dictyocaulus viviparus*.

DORAX 1 % também é indicado no controle de ectoparasitos de bovinos tais como bernes (larvas de *Dermatobia hominis*), piolhos (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*), ácaros da sarna (*Psoroptes bovis*), na prevenção das bicheiras (larvas de *Cochliomyia hominivorax*) e como auxiliar no controle de carrapatos (*Boophilus microplus*).

Ovinos:

DORAX 1 % é indicado no controle de formas adultas dos seguintes nematódeos gastrintestinais: *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata* e *Nematodirus spathiger*.

DORAX 1 % também é indicado na prevenção das miases (bicheiras) causadas por *Cochliomyia hominivorax*, bernes (larvas de *Dermatobia hominis*), "bicho-da-cabeça" (larvas de *Oestrus ovis*) e ácaro da sarna (*Psoroptes ovis*).

Posologia e modo de usar:

Bovinos:

Deve-se administrar em dose única, por via subcutânea ou intramuscular, 0,2 mg de doramectina por kg de peso corporal, ou seja, 1 mL de **DORAX 1 %** para cada 50 kg de peso, de acordo com a tabela a seguir. A aplicação deve ser feita na região do pescoço na área de pele solta na frente ou atrás da paleta (via subcutânea) ou no pescoço (via intramuscular).

Bovinos	
Peso (kg)	Dose (mL)
50	1,0
100	2,0
150	3,0
200	4,0
250	5,0





300	6,0
350	7,0
400	8,0
500	10,0

Ovinos:

Deve-se administrar em dose única, por via subcutânea ou intramuscular, 0,2 mg de doramectina por kg de peso corporal, ou seja, 1 mL de **DORAX 1 %** para cada 50 kg de peso, de acordo com a tabela a seguir.
A aplicação deve ser feita na região da axila, onde não há lâ (via subcutânea) ou na anca (via intramuscular).

Ovinos	
Peso (kg)	Dose (mL)
10	0,2
20	0,4
30	0,6
40	0,8
50	1,0
60	1,2
70	1,4
80	1,6
90	1,8

Para o tratamento dos ácaros da sarna em ovinos, deve-se administrar 0,3 mg/kg de doramectina por kg de peso corporal, ou seja, 1 mL para cada 33 kg de peso.

Contraindicações:

O produto não deve ser administrado a vacas leiteiras com 20 meses de idade ou mais.
O produto não deve ser utilizado em bezerros destinados a vitela.

Precauções:

Siga as práticas usuais de assepsia para injeções subcutâneas e intramusculares.
Em áreas de alta incidência de infecções por *Clostridium*, recomenda-se a vacinação dos animais quando são utilizados produtos injetáveis.
Evite fumar, comer ou beber durante a administração do produto. Lave as mãos após o manuseio.

Período de carência:

Recomenda-se que os bovinos cuja carne seja destinada ao consumo humano somente sejam abatidos 34 dias após a última administração do produto.
Recomenda-se que os ovinos cuja carne seja destinada ao consumo humano somente sejam abatidos 35 dias após a última administração do produto.

Apresentação:

Frascos-ampola com 50 mL, 200 mL, 500 mL e 1 L.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 9.382 em 18/03/2008.

Responsável Técnico:
Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000
DDG: 0800 701 1799 – CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

